

Στοχαστικές Ανελίξεις

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2006

ΣΕΜΦΕ

Ζήτημα 1^o. Έστω N διακριτή τ.μ. με σ.μ.π. $p_n = P[N = n]$ ($n = 0, 1, \dots$) και με γεννήτρια πιθανοτήτων $\pi(s)$. Έστω $\{Y_i : i = 1, 2, \dots\}$ ακολουθία ανεξάρτητων και ισόνομων τ.μ. με ροπογεννήτρια συνάστηση $g_Y(s)$.

- (α) Να δειχθεί ότι η ροπογεννήτρια συνάρτηση του αθροίσματος $X = \sum_1^N Y_i$ με τυχαίο αριθμό όρων N , είναι:

$$g_X(s) = \pi(g_Y(s)).$$

- (β) Αν οι ανεξάρτητες τ.μ. $\{Y_i : i = 1, 2, \dots\}$ ακολουθούν Εκθετική κατανομή παραμέτρου θ και η τ.μ. N ακολουθεί Γεωμετρική κατανομή παραμέτρου p , ποια η κατανομή της τ.μ. X ;

Ζήτημα 2^o. Θεωρούμε τον τυχαίο περίπατο $\{X_n = X_{n-1} + Y_n : n = 1, 2, \dots\}$ με χώρο καταστάσεων το σύνολο $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, αρχική κατάσταση $X_0 = 0$ και ανεξάρτητες προσαυξήσεις $Y_n = +1, -1, 0$ με αντίστοιχες πιθανότητες $p = P[Y_n = 1]$, $q = P[Y_n = -1]$ και $r = P[Y_n = 0]$ ($p+q+r = 1$). Να προσδιοριστεί η ροπογεννήτρια συνάρτηση των προσαυξήσεων Y_n και με εφαρμογή της ταυτότητας του Wald να προσδιοριστούν οι πιθανότητες απορρόφησης a και b με απορροφητικά φράγματα $-a$ ($-a < X_0$) και b ($b > X_0$).

Ζήτημα 3^o Έστω $\{X_n : n = 0, 1, 2, \dots\}$ Μαρκοβιανή αλυσίδα με χώρο καταστάσεων S και $g : S \rightarrow T$ αμφιμονοσήμαντη συνάρτηση. Να δείξετε ότι η $\{Y_n = g(X_n) : n = 0, 1, 2, \dots\}$ είναι επίσης Μαρκοβιανή αλυσίδα.

Ζήτημα 4^o. Δίνονται οι παρακάτω Στοχαστικοί Πίνακες:

$$P_1 = E_1 \begin{bmatrix} 0.4 & 0 & 0 & 0.6 \\ 0.2 & 0 & 0 & 0.8 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.7 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$P_2 = E_1 \begin{bmatrix} 0.4 & 0.6 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.2 & 0 & 0.8 & 0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.7 & 0 & 0 & 0 & 0.3 \end{bmatrix}$$

- (α) Να ταξινομηθούν οι καταστάσεις σε κλάσεις.
 (β) Να γίνει ιεράρχηση των κλάσεων.
 (γ) Να προσδιοριστούν, αν υπάρχουν, οι κλειστές κλάσεις.
 (δ) Να γραφούν οι στοχαστικοί πίνακες υπό την "κανονική" μορφή:

$$P = \begin{bmatrix} Q & 0 \\ R & T \end{bmatrix}$$

και να καθορίσετε τις παροδικές, επαναληπτικές, γνήσια επαναληπτικές και περιοδικές κλάσεις, εάν υπάρχουν.

Ζήτημα 5^o. Θεωρούμε τον απλό τυχαίο περίπτωτο $\{X_n : n = 0, 1, 2, \dots\}$ με χώρο καταστάσεων $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ και πιθανότητες μετάβασης $p_{i,i+1} = p_i$, $p_{i,i-1} = q_i = 1 - p_i$ με $0 < p_i < 1$ για όλα τα $i > 1$ και $p_0 = 0$, είναι δηλαδή η κατάσταση “0” απορροφητική. Έστω A το ενδεχόμενο απορρόφησης στην κατάσταση “0” και $a_i = P[A|X_0 = i]$ ($i \geq 0$). Να δείξετε τα παρακάτω:

(α) Οι πιθανότητες a_i ικανοποιούν την διαφοροεξίσωση

$$a_i = a_{i+1}p_i + a_{i-1}q_i \quad (i > 1) \text{ με } a_0 = 1.$$

(β) Θέτοντας $\delta_i = a_{i-1} - a_i$, να λύσετε την ως άνω διαφοροεξίσωση και να προσδιορίσετε τη συνθήκη κάτω από την οποία έχουμε πιθανότητες απορρόφησης $a_i < 1$ για όλα τα $i > 1$.

Να επιλέξετε 4 από τα 5. Τα θέματα είναι ισοδύναμα

Διάρκεια εξέτασης: 2.30' h.

Καλή επιτυχία