

## ΘΕΜΑ Λ :

(i)

	κορόνωμα	ρύζι	οπανάκι	
πρωτεΐνη ( $\text{gr}/\text{δόση}$ )	10	2	1	$\geq 30$
σίδηρο ( $\text{mg}/\text{δόση}$ )	5	0	20	$\geq 50$
άτμιδο ( $\text{mg}/\text{δόση}$ )	0	10	0	$\geq 40$
Δίπος ( $\text{gr}/\text{δόση}$ )	20	15	5	

Μεταβλήτες $X_1 := \# \text{ δόσεων κορόνωμα} / \text{μένου}$  $X_2 := \# \text{ ρύζιος} / \text{μένου}$  $X_3 := \# \text{ οπανακιού} / \text{μένου}$ Ανυκριτική Συνάρτηση (ελαχιστοποίηση Δίπος)

$$\min z = 20x_1 + 15x_2 + 5x_3$$

Πριορίστοι

Ελαχιστοποίηση ποστικών

$$\left\{ \begin{array}{l} 10x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 30 \\ 5x_1 + 20x_3 \geq 50 \\ 10x_2 \geq 40 \end{array} \right.$$

Μη αρνητικότητα

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

2

(ii) Αλγόριθμος Simplex προβλημάτων που  
εριστονται σαν τυποποιημένη μορφή sunt.

Βήμα 1: Μορφοποιώ το πρόβλημα σαν μορφή  
ενός συνικάτος γραμμικών εξισώσεων  
εισάγοντας πριθώρια μεταβλήτες  
σαν περιορισμούς και εκφράζοντας  
την απικεκριμένη συνθήκη σαν  
κανονική της μορφή.

Βήμα 2: Κατασκευάζω το αρχικό tableau  
Simplex

Βήμα 3: Εφαρμόζω το εργαλείο βελτιστοποίησης.  
Αν η βασική εφεσή λίστα είναι  
βέλτιστη, το πρόβλημα λύθηκε.  
Αλλιώς προχωρώ στο Βήμα 4.

Βήμα 4: Υπολογίζω το νέο tableau  
Simplex, ως ακολούθως:

- (a) Επιλέγω την οδιγό σημείου
- (b) Επιλέγω την οδιγό γραμμής
- (c) Κάνω οδιγητού με βάση την  
οδιγό ποικείο.

Βήμα 5: Επιαρέψω στο Βήμα 3.

$$(iii) \max -Z = -80x_1 - 15x_2 - 5x_3$$

$$-10x_1 - 2x_2 - x_3 \leq -30$$

$$-5x_1 - 20x_3 \leq -50$$

$$-10x_2 \leq -40$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$20x_1 + 15x_2 + 5x_3 - Z = 0$$

$$-10x_1 - 2x_2 - x_3 + s_1 = -30$$

$$-5x_1 - 20x_3 + s_2 = -50$$

$$-10x_2 + s_3 = -40$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$s_1$	$s_2$	$s_3$	$m$	
-10	-2	-1	1	0	0	0	-30
-5	0	-20	0	1	0	0	-50
0	-10	0	0	0	1	0	-40
20	15	5	0	0	0	-1	0

Η γελτενταίρια συνήν έχει αρκηγούς δρους.

Θεωρούμε τον  $-50$ . Θεωρούμε τον  $-5$

σαν γραφτήν του  $-50$  σαν  $1$ η συνήν.

Υπολογίζουμε τους λόγους

$$-30/-10 = 3 \text{ (μικρότερος θευρός)}$$

$$-50/-5 = 10$$

1	0.2	0.1	-0.1	0	0	0	3
0	1	-19.5	-0.5	1	0	0	-35
0	-10	0	0	0	1	0	-40
0	11	3	2	0	0	-1	-60

4

Επιλέγουμε ως -40 και αν συνέχεια ως -10 την  
ρραφή του. Οι λόγοι είναι

$$3/0.2 = 15$$

$$-35/-1 = -35$$

$$-40/-10 = 4 \quad (\text{μη πρότυπος θετικός})$$

$$\left[ \begin{array}{ccccccc|c} 1 & 0 & 0.1 & -0.1 & 0 & +0.02 & 0 & 2.2 \\ 0 & 0 & -19.5 & \textcircled{-0.5} & 1 & -0.1 & 0 & -39 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -0.1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 0 & +1.1 & -1 & -104 \end{array} \right]$$

Επιλέγουμε ως -39 και ως -0.5, οι λόγοι είναι

$$2.2/-0.1 = -22$$

$$-39/-0.5 = 78 \quad (\text{μη πρότυπος θετικός})$$

$$\left[ \begin{array}{ccccccc|c} 1 & 0 & 4 & 0 & -0.2 & +0.04 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & \textcircled{39} & 1 & -2 & 0.2 & 0 & 78 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -0.1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -75 & 0 & -2 & +0.7 & -1 & -260 \end{array} \right]$$

Το πρόβλημα έχει αναχθεί σε νέα  
ωποποιημένη μορφή του.

ΘΕΜΑ 2: || Ελαχιστοποίηση  $C = RX$   
υπό τους περιορισμούς  $AX \geq G$

$$R = \begin{bmatrix} 8 & 16 & 14 & 7 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 50 \\ 120 \\ 70 \\ 100 \end{bmatrix}$$

Προετοίκουν και ερωτήσεις το Δυϊκό Πρόβλημα

υποδομήσουντες ταυτορομούς των πινακών

$$R' = \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \\ 14 \\ 7 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \\ t \end{bmatrix}, A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, G' = \begin{bmatrix} 50 \\ 120 \\ 70 \\ 100 \end{bmatrix}$$

Το Δυϊκό πρόβλημα είναι

|| Μεγιστοποίηση  $C = G'U$   
υπό τους περιορισμούς  $A'U \geq R'$

$$\max C = 50u + 120v + 70r + 100t$$

υπό τους περιορισμούς

$$u + r \geq 8$$

$$u + t \geq 16$$

$$v + r \geq 14$$

$$v + t \geq 7$$

Προετοίκασία Δυϊκών προβλημάτων για την επίλυση  
των με τη φέθοδο Simplex

$$-50u - 120v - 70r - 100t + C = 0$$

$$u + r + s_1 = 8$$

$$u + t + s_2 = 16$$

$$v + r + s_3 = 14$$

$$v + t + s_4 = 7$$

Αρχικό		Tableau				Simplex:			
u	v	r	t	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	s <sub>3</sub>	s <sub>4</sub>	c	
4	0	1	0	1	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	1	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	1	0	0	
0	1	0	1	0	0	0	1	0	
-50	-120	-70	-100	0	0	0	0	1	
								0	

Η περισσότερο αρνητική γιατί στην πεδίωση  
γρεφτήν είναι 20 -120.

Υπολογίζουμε τους λόγους.

$$14/1 = 14$$

$$7/1 = 7 \text{ (μικρότερη θέση)}$$

Οδηγός ποικιλίας είναι 20 1 στη θέση (4,2).

Μετά την οδηγίαν το tableau γίνεται

1	0	1	0	1	0	0	0	0	8
1	0	0	1	0	1	0	0	0	16
0	0	1	-1	0	0	1	-1	0	7
0	1	0	1	0	0	0	1	0	7
-50	0	-70	20	0	0	0	120	1	840

Η πλέον αρνητική γιατί στη πεδίωση πράγματος  
είναι 20 -70. Οι λόγοι είναι:

$$8/1 = 8$$

$$7/1 = 7 \text{ (μικρότερη θέση)}$$

Οδηγός 20 1 στη θέση (3,3)

To νέο tableau simplex είναι:

$$\left[ \begin{array}{ccccccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7 \\ \hline -50 & 0 & 0 & -50 & 0 & 0 & 70 & 50 & 1 & 1330 \end{array} \right]$$

Υπάρχουν δύο εξίσου μεγάλες αριθμητικές τιμές.

Επιλεγούμε τυχαία την  $-50$  σαν 1<sup>η</sup> σύλλη.

$$16/1 = 16$$

$$1/1 = 1 \text{ (μικρότερη θετική)}$$

Οδηγός των 1 σαν θέση  $(1,1)$ .

$$\left[ \begin{array}{ccccccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 50 & 0 & 20 & 100 & 1 & 1380 \end{array} \right]$$

Ικανοποιείται το κριτήριο θετικούτητας

Η θέση είναι  $C=1380$ . Αρα το ελάχιστο  
κόστος σαν αρχικό πρόβλημα είναι 1380.  
Οι τιμές των μεταβλητών του αρχικού προβλήματος είναι οι τιμές των χαλαρών μεταβλητών  
σαν γενεντοία γραφτί του πίνακα simplex.  
Δηλαδή  $(x, y, z, w) = (50, 0, 20, 100)$ .

ΘΕΜΑ 3 : Α) ΘΕΩΡΙΑ

B)  $D = 100 \cdot 360 = 36000$   $K_u = 3 \text{ €}$

$$K = 100$$

$$K_c = 0,02 \text{ €/η} \cdot 360 \text{ η} = 7,2 \text{ €/ετος}$$

(i)  $EOQ = Q = \sqrt{\frac{2KD}{K_c}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 360}{0,02 \cdot 360}} = 1000 \text{ πινακ.$

(ii)  $F(R) = 1 - \frac{K_c Q}{K_u D} = 1 - \frac{0,02 \cdot 360 \cdot 1000}{3 \cdot 100 \cdot 360} = 1 - 0,067$   
 $= 0,933$

Από πίνακα ρυθμίσης καραβούνων

$$Z = 1,5$$

$$\bar{M} = 100 \text{ πιν.}/\text{η} \cdot 16 \text{ η} = 1600 \text{ πιν.}$$

$$\sigma_{\bar{M}} = \sqrt{L} \cdot \sigma = \sqrt{16} \cdot 10 \text{ πιν.}/\text{η} = 40 \text{ πιν.}$$

$$R = \bar{M} + Z \sigma_{\bar{M}} = 1600 + 1,5 \cdot 40 = 1660 \text{ πιν.}$$

(iii)  $TC = [K + K_u \sigma_{\bar{M}} N(Z)] \frac{D}{Q} + \left[ \frac{Q}{2} + (R - \bar{M}) \right] K_c$   
 $= (100 + 3 \cdot 40 \cdot 0,02931) \frac{100 \cdot 360}{1000} + \left( \frac{1000}{2} + (1660 - 1000) \right) 7,2$   
 $= 3726,6 + 4032$   
 $= 7758,6$

### Θέμα 4 :

Έχουμε δύο ανεξάρτητα υποσυνήθαις  $M/M/1$ . Με συγχρεόνη μεταίξη πέριπτων του χρόνου τηνώρα, ο ήπειρος πυθμένος αφίστηκε ως Poisson διαδικασίας εποόδου ενώ  $\lambda = 20$  ενοτήτες την ώρα για κάθε υποσυνήθη χρήση.  $\mu_A = \sigma_A = 3$  λεπτά/εαν  $CV_A = \frac{\sigma_A}{\mu_A} = 1$ . Κάθε υποσυνήθη απόκρισης χρειάζεται πάρα μέσο όρο 2.5 λεπτά ανε κάθιση, οπότε ο ήπειρος πυθμένος εξυπηρέτησης είναι  $\mu = 24$  κάθισες την ώρα.

Έχουμε λοιπόν  $\mu_S = \sigma_S = 2.5$  λεπτά. Επειδή για την ίδια ζεχωριστή υποσυνήθη  $M/M/1$  ισχύει  $\mu_S < \mu_A$ , καθένα από αυτά αγρίνει σε καλύτερην ισορροπία των μηπορεύσεων κανούμε τους υπολογισμούς σύμφωνα με τους γύρους του μονέλου  $M/M/1$ .

Ευνερδεούσις επιβάρυνσης του ιδίου υποσυνήθαις:

$$\rho = \frac{\mu_S}{\mu_A} = \frac{2.5}{3} = 0.833 = 83.3\%$$

Πολλαπλασιασμός χρόνου ανατομίας:

$$WTM = \frac{\rho}{1-\rho} \left( \frac{CV_A^2 + CV_S^2}{2} \right)$$

$$= \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{1+1}{2} = \frac{\rho}{1-\rho}$$

$$= \frac{0.833}{1-0.833} = 5$$

Θ4 | A)

$\mu_W = \mu_S \cdot WTM = 2.5 \cdot 5 = 12.5$  Αετήρα μέσος  
χρόνος αναφορικής κατακύρωσης

$\mu_L = \frac{\mu_W}{\mu_A} = \frac{12.5}{3} = 4.1667$  κατακύρωσης ετών το  
μέσο μήνας της καθετικής ουπάς

B) Το ενωτήριός αποθήπος κατίσεων νο συνήθεια  
είναι κατά μέσο όρο δύο κατίσεις βρίσκονται  
κατά μέσο όρο στην αναφορική και δύος  
κατίσεις βρίσκονται κατά μέσο όρο στην  
εξυπηρέτηση. Άρα

$4.1667 \text{ NL.} + 0.8333 = 5$  κατίσεις  
με κόδος  $5 \times 0.5 = 2.5$  € ανά υπά

Το κύριος νω είναι εξυπηρέτηση  
(αυτόματου μηχανισμάτος) είναι

$3 \text{ €/} \text{υπά} \times 1 \text{ εξυπηρέτηση} = 3 \text{ € ανά υπά}$   
κατά επιφένεια το συνολικό κόδος είναι  
 $TC = 2 \text{ εξυπηρέτηση} \times (2.5 \text{ €/υπά} + 3 \text{ €/υπά})$   
 $= 11 \text{ €/υπά}$  τα για τους δύο.